

LIGHTS OUT

TOBACCO USE IS THE **LEADING CAUSE** OF PREVENTABLE DEATH IN THE U.S.

TOBACCO KILLS MORE AMERICANS THAN AIDS, ALCOHOL, CAR ACCIDENTS, MURDERS, SUICIDES, DRUGS, AND FIRES **COMBINED!**

CIGARETTES KILL **1 OUT OF EVERY 3** PEOPLE WHO USE THEM.

IN THE U.S., ABOUT **1,200 PEOPLE DIE** EVERY DAY FROM TOBACCO-RELATED DISEASE.

ON AVERAGE, SMOKERS DIE **13 TO 14 YEARS EARLIER** THAN NONSMOKERS.

IN THE U.S., SECONDHAND SMOKE EXPOSURE IS RESPONSIBLE FOR ABOUT **49,000** OF THESE TOBACCO-RELATED DEATHS.


IN THE U.S., TOBACCO USE IS RESPONSIBLE FOR ABOUT **1 IN 5 DEATHS EACH YEAR.** THAT'S **443,000** DEATHS A YEAR.

SINCE 1964, THERE HAVE BEEN MORE THAN **12 MILLION** TOBACCO-RELATED DEATHS IN THE U.S.

WORLDWIDE, TOBACCO USE CAUSES MORE THAN **5 MILLION** DEATHS EACH YEAR.

SMOKING DURING PREGNANCY AND EXPOSURE TO SECONDHAND SMOKE RESULTS IN THE **DEATHS OF ABOUT 776 INFANTS** EVERY YEAR IN THE U.S.

SINCE 1964, THERE HAVE BEEN **94,000** TOBACCO-RELATED FETAL AND INFANT DEATHS IN THE U.S.



¿VAS A ENCENDER UNO?

EL CONSUMO DE TABACO ES LA CAUSA PRINCIPAL DE MUERTES EVITABLES EN ESTADOS UNIDOS.

¡EL TABACO MATA A MÁS NORTEAMERICANOS QUE EL SIDA, EL ALCOHOL, LOS ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS, LOS ASESINATOS, LOS SUICIDIOS, LAS DROGAS Y LOS INCENDIOS COMBINADOS!

LOS CIGARRILLOS MATAN A 1 DE CADA 3 PERSONAS QUE LOS CONSUME.

EN ESTADOS UNIDOS, ALREDEDOR DE 1,200 PERSONAS MUEREN A DIARIO DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TABACO.

EN PROMEDIO, LOS FUMADORES MUEREN DE 13 A 14 AÑOS ANTES QUE LOS NO FUMADORES.

EN ESTADOS UNIDOS, LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE SEGUNDA MANO ES RESPONSABLE DE ALREDEDOR DE 49,000 DE LAS MUERTES ASOCIADAS AL CONSUMO DE TABACO.

EN ESTADOS UNIDOS, EL CONSUMO DE TABACO ES RESPONSABLE DE ALREDEDOR DE 1 DE CADA 5 MUERTES CADA AÑO. ESO ES 443,000 MUERTES ANUALMENTE.

DESDE 1964, SE HAN PRESENTADO MÁS DE 12 MILLONES DE MUERTES ASOCIADAS AL TABACO EN ESTADOS UNIDOS.

EL CONSUMO DE TABACO A NIVEL MUNDIAL OCASIONA MÁS DE 5 MILLONES DE MUERTES AL AÑO.

FUMAR DURANTE EL EMBARAZO Y LA EXPOSICIÓN AL HUMO DE SEGUNDA MANO OCASIONA LA MUERTE DE ALREDEDOR DE 776 BEBÉS AL AÑO EN ESTADOS UNIDOS.

DESDE 1964, SE HAN PRODUCIDO 94,000 MUERTES, ASOCIADAS AL TABACO, EN FETOS Y BEBÉS EN ESTADOS UNIDOS.